



Association Orchidée 17

Fiche de culture :

Les Liparis condylobulbon



Facilité de culture : Réputée facile

Distribution géographique : Asie (Inde, Japon, Corée, Taiwan, Nouvelle Guinée, îles du Pacifique et nord du Queensland), Australie, Philippines.

Sur la partie supérieure des branches basses des arbres, ou les troncs moussus à des altitudes variant de 0 à 1600 m, le plus souvent au-dessus des plages et lagunes mais aussi dans la canopée intermédiaire de forêts de persistants ou conifères.

Végétation : pseudobulbes portant une ou plusieurs feuilles de forme linéaire à ovale. L'inflorescence est terminale, érigée et non ramifiée, elle porte de nombreuses fleurs assez petites vertes, jaunes, orangées.

Taille de la plante : 50 cm - Petites fleurs.

Durée de floraison : Été - automne

Parfums : Non

Éclairage : semi ombragé, jamais de soleil direct.

Températures : Tempéré chaud (18°-30°C) - nuit (16°-25°)

Mise en extérieur possible (juin-septembre)

Hygrométrie : humide

Arrosages : en profondeur toutes les semaines.

Garder le substrat humide.

Réduire en hiver sans laisser le substrat sécher.

Apport d'engrais : 1 fois par mois

Période de repos : non

Rempotage : culture uniquement en pot

Substrat : Mélange bien drainant mais retenant l'humidité : écorces de pin + billes d'argile

Multiplication : division

Remarques :

Rédigée le 29 février 2024